

PELIGROS DE PERCEPCIÓN 2020:

Causas de
muerte

Estos son los últimos hallazgos de la encuesta Ipsos **Peligros de Percepción**. La encuesta se realizó en **32 países** y preguntó a las personas cuáles creen que son las principales **causas de muerte** en su país.

Por el propósito del estudio, la principal fuente de datos "reales" que permiten la comparación con las percepciones fue la base de datos Global Burden of Disease (GBD) del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) año 2017.

CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO




En todos los países, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son la principal causa de muerte en todas las edades.


Cuando se combinan, representan alrededor de la mitad de todas las muertes en los 32 países del estudio.

Causas

Enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón
Cancer
Desórdenes neurológicos
Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía
Enfermedades respiratorias crónicas como el asma
Diabetes y enfermedades renales
Enfermedades digestivas
Muertes accidentales como ahogamiento
Lesiones de transporte
Suicidio
VIH / SIDA e infecciones de transmisión sexual
Violencia interpersonal
Trastornos por consumo de sustancias
Terrorismo y conflicto

% causas reales de muerte– personas de todas las edades (promedio. en todos los países)

Actual 



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

*Indicates a value higher than 0 but less than 0.5


En todos los países, las personas en promedio subestiman la proporción de muertes por enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Y el público tiende a sobreestimar cuántas personas mueren por lesiones en el transporte, terrorismo, violencia interpersonal y trastornos por uso de sustancias como la adicción a las drogas y al alcohol.

Causas

Enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón
Cancer
Desórdenes neurológicos
Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía
Enfermedades respiratorias crónicas como el asma
Diabetes y enfermedades renales
Enfermedades digestivas
Muertes accidentales como ahogamiento
Lesiones de transporte
Suicidio
VIH / SIDA e infecciones de transmisión sexual
Violencia interpersonal
Trastornos por consumo de sustancias
Terrorismo y conflicto

% causas reales de muerte – personas de todas las edades (promedio. en todos los países)



Diferencia

-21
-9
-4
-1
+1
+2
+1
+4
+8
+5
+4
+7
+7
+5

Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

Entre los 15 y 49 años, el cáncer es la principal causa de muerte, seguido de las enfermedades cardiovasculares y el suicidio.


En los 32 países del estudio, una cuarta parte de los jóvenes de 15 a 49 años muere como resultado del cáncer. La enfermedad cardiovascular y el suicidio representan el 16% y el 12% de las muertes, respectivamente

Causas

Cancer
Enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón
Suicidio
Lesiones de transporte
Muertes accidentales como ahogamiento
Enfermedades digestivas
Violencia interpersonal
Trastornos por consumo de sustancias
VIH / SIDA e infecciones de transmisión sexual
Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía
Diabetes y enfermedades renales
Desórdenes neurológicos
Enfermedades respiratorias crónicas como el asma
Terrorismo y conflicto

causas reales de muerte: personas de 15 a 49 años (promedio en todos los países)

Real 



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

*Indicates a value higher than 0 but less than 0.5



En promedio, las personas también subestiman la proporción de personas de 15 a 49 años que mueren de cáncer y enfermedades cardiovasculares cada año

Y sobreestiman la proporción de personas que mueren como resultado de la violencia interpersonal, como asesinatos, trastornos por abuso de sustancias y VIH e ITS.


Causas

Cancer
Enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón
Suicidio
Lesiones de transporte
Muertes accidentales como ahogamiento
Enfermedades digestivas
Violencia interpersonal
Trastornos por consumo de sustancias
VIH / SIDA e infecciones de transmisión sexual
Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía
Diabetes y enfermedades renales
Desórdenes neurológicos
Enfermedades respiratorias crónicas como el asma
Terrorismo y conflicto

% causas reales de muerte – personas de todas las edades (promedio. en todos los países)

Reall 
Suposición 

Diferencia




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

*Indicates a value higher than 0 but less than 0.5


En promedio, las personas también subestiman la proporción de personas de 15 a 49 años que mueren de cáncer y enfermedades cardiovasculares cada año

Y sobreestiman el número de personas que mueren como resultado de la violencia interpersonal, como asesinatos, trastornos por consumo de sustancias y VIH e ITS




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

Existe una amplia variación en las causas de muerte reales y estimadas en los 32 países del estudio



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

Existe una amplia variación en las causas de muerte reales y estimadas en los 32 países del estudio




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

CAUSAS DE MUERTE : ENFERMEDADES E INFECCIONES



P. De cada 100 muertes en [PAÍS] – aproximadamente cuantas son resultado de cáncer?


La mayoría de los países en el estudio subestiman la proporción de personas que mueren de cáncer cada año



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

P. De cada 100 muertes en [PAÍS] - ¿aproximadamente cuantas son resultado de enfermedades cardiovasculares como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o insuficiencia cardíaca?


Todos los países del estudio subestiman la cantidad de personas que mueren por enfermedades cardiovasculares, como enfermedades cardíacas cada año.



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

P. De cada 100 muertes en [PAÍS] - aproximadamente muchas son resultado de trastornos neurológicos como la demencia o la enfermedad de Parkinson?


Varios países también subestiman la proporción de personas que mueren por trastornos neurológicos como la demencia o la enfermedad de Parkinson.




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

P. De cada 100 muertes en [PAÍS] - ¿aproximadamente cuantas son el resultado de VIH / SIDA o infecciones de transmisión sexual (ITS)?

Casi todos los países del estudio sobreestiman la proporción de muertes causadas por el VIH / SIDA o las ITS






CAUSAS DE MUERTE : CONFLICTO, TERRORISMO Y VIOLENCIA

P. De cada 100 muertes en [PAÍS], ¿aproximadamente cuántas son resultado de la violencia interpersonal como el homicidio / asesinato?


La gente sobreestima la proporción de muertes por violencia interpersonal (asesinato / homicidio).



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

P. De cada 100 muertes en [PAÍS], ¿aproximadamente cuántas son resultado del terrorismo y el conflicto?

En todos los países, la gente sobreestima la proporción de personas asesinadas por el terrorismo y los conflictos.



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.


*Indicates a value higher than 0 but less than 0.5



CAUSAS DE MUERTE : TRASTORNOS DE USO DE SUSTANCIAS

P. De cada 100 muertes en [PAÍS], ¿aproximadamente cuantas son resultado de trastornos por uso de sustancias como la adicción a las drogas o al alcohol?

Todos los países sobreestiman la proporción de muertes por adicción al alcohol y las drogas..



*Indicates a value higher than 0 but less than 0.5


Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

CAUSAS DE MUERTE : SUICIDIO



P. De cada 100 muertes en [PAÍS], ¿aproximadamente muchas son resultado del suicidio?

Todos los países del estudio sobreestiman la proporción de personas (de todas las edades) que se suicidan




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.



CAUSAS DE MUERTE : LESIONES DE TRANSPORTE

P. De cada 100 muertes en [PAÍS], ¿aproximadamente cuantas son resultado de lesiones en el transporte, como accidentes de tráfico?

Cada país sobreestima la proporción de personas que mueren en accidentes de tráfico cada año.



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

CAUSAS DE LA MUERTE : FACTORES DE RIESGO

¿QUE PIENSAN LAS
PERSONAS QUE ES
MAS PROBABLE QUE
AUMENTE LA
PROBABILIDAD DE
MUERTE?



Cuando se les pregunta sobre los riesgos relativos asociados con la muerte, las personas seleccionan fumar, el consumo de drogas y alcohol y la presión arterial alta como los principales "factores de riesgo".

p. De cada 100 muertes en [PAÍS] - aproximadamente cuántas se pueden vincular a las siguientes cosas ...

Causas

Fumar o humo secundario

El consumo de drogas

Alta presión sanguínea

Consumo de alcohol

Masa corporal alta (obesidad)

Nivel alto de azúcar en la sangre

Baja actividad física


Sexo sin protección

Aire exterior o contaminación o contaminación doméstica.

Dieta baja en frutas o verduras

Otro

% vinculado a muertes - todas las edades (todos los países)



Please see <http://perils.ipsos.com> for full details of all sources.

Aunque no es directamente comparable, las cifras de IHME GBD sugieren que la presión arterial alta y el tabaquismo son los principales factores de riesgo para los países en este estudio

Causas

Hipertensión arterial (muertes)

Fumar y humo de segunda mano

Nivel alto de azúcar en la sangre (muertes)

Contaminación del aire (exterior e interior) (muertes)

Obesidad (muertes)

Consumo de alcohol (muertes)

Dieta baja en frutas (muertes)

Dieta baja en verduras (muertes)

Baja actividad física (muertes)

Uso de drogas (muertes)

Sexo inseguro (muertes)


% vinculado a muertes - todas las edades (todos los países)



Please see <http://perils.ipsos.com> for full details of all sources.

EL INDICE DE ERRORES EN LA PERCEPCIÓN

El índice de errores en la percepción – who's most wrong?



SESGOS

QUE SESGOS
PUEDEN ESTAR
INFLUENCIANDO
EN LA
PERCEPCIÓN DE
LA GENTE?



Descripción general de las cosas que podrían estar influyendo en las percepciones de las personas


█ Most mentions
█ 2nd most mentions
█ 3rd most mentions

	% diciendo que ven con más frecuencia en las noticias	% diciendo que han sido personalmente afectados por	% diciendo la forma más desagradable de morir	% diciendo lo que tienen menos control sobre	% diciendo que es más probable que les pase
<i>Lesiones de transporte como accidentes de tráfico</i>	38%	45%	23%	30%	25%
<i>Violencia interpersonal como homicidio / asesinato</i>	37%	14%	21%	17%	8%
<i>Terrorismo y conflicto</i>	35%	12%	26%	32%	7%
<i>Cancer</i>	29%	70%	40%	31%	31%
<i>Muertes accidentales como ahogamientos, incendios y caídas ¹</i>	22%	22%	27%	23%	14%
<i>Suicidio</i>	19%	25%	-	-	-
<i>Enfermedades cardiovasculares como enfermedades cardíacas como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o insuficiencia cardíaca</i>	13%	60%	12%	13%	24%
<i>Trastornos por consumo de sustancias, como adicción a las drogas o al alcohol</i>	15%	35%	9%	8%	4%
<i>Diabetes o enfermedades renales</i>	8%	58%	8%	9%	16%
<i>VIH / SIDA o infecciones de transmisión sexual (ITS)</i>	7%	11%	16%	8%	3%
<i>Trastornos neurológicos como la demencia o la enfermedad de Parkinson</i>	4%	33%	14%	17%	11%
<i>Enfermedades respiratorias crónicas como el asma como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)</i>	4%	40%	8%	7%	9%
<i>Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía, como neumonía o tuberculosis</i>	3%	34%	5%	6%	8%
<i>Enfermedades del sistema digestivo como cirrosis o enfermedad hepática</i>	3%	28%	6%	6%	7%

A close-up photograph of a person's hand holding a black video game controller. The hand is positioned on the right side of the frame, with the thumb resting on one of the red buttons. The background is a blurred, dark blue-grey color, suggesting a person wearing a shirt. The overall lighting is soft and focused on the hand and controller.

CAUSAS DE MUERTE : LO QUE VEMOS EN LAS NOTICIAS

... y la gente dice que ve lesiones en el transporte, violencia interpersonal y terrorismo / conflicto con mayor frecuencia en las noticias



En promedio, Internet y la televisión son las fuentes de noticias más populares en todos los países...

Uno de cada cinco (18%) usa las redes sociales como su principal fuente de noticias, mientras que uno de cada diez usa aplicaciones móviles de noticias (10%) o radio (9%).

Fuente de noticias

Online/Internet

Television

Medios de comunicación social


Aplicaciones de noticias móviles

Radio

Periódicos / revistas

Ninguno de esos

En todos los países




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

... pero hay una gran variación en el lugar donde las personas reciben sus noticias en todos los países.


En Rusia, cuatro de cada diez (39%) obtienen la mayoría de sus noticias en línea, mientras que en Hong Kong, SAR, China, la cifra es del 21%.

Country

¿Cómo obtienes la mayoría de tus noticias? Top choice



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

A silhouette of a person sitting on a swing, looking out over a body of water at sunset. The person's right arm is extended outwards. The background is a warm, orange and yellow sky over a dark sea.

CAUSAS DE MUERTE :

POR QUE SE HAN VISTO AFECTADAS PERSONALMENTE LAS PERSONAS

Es más probable que las personas hayan sido afectadas personalmente por cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes o enfermedades renales.

■ Most mentions
■ 2nd most mentions
■ 3rd most mentions

% diciendo que han visto afectados personalmente por (top menciones)

	TOTAL	AR	AU	BE	BR	CA	CL	CN	CO	FR	DE	HU	HK	IN	IT	JP	MY	MX	NL	PE	PH	PL	RO	RU	SA	SG	ZA	KR	ES	SE	TR	UK	US
Cancer	70%	68%	80%	74%	59%	85%	77%	54%	69%	76%	61%	73%	45%	59%	79%	65%	77%	65%	66%	78%	61%	77%	70%	68%	47%	75%	70%	66%	78%	74%	75%	82%	77%
'Enfermedades cardiovasculares como enfermedades cardíacas como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o insuficiencia cardíaca'	60%	63%	62%	55%	60%	63%	70%	61%	61%	55%	46%	71%	42%	62%	59%	43%	75%	66%	58%	62%	75%	75%	65%	74%	49%	66%	63%	30%	55%	69%	71%	64%	64%
Diabetes o enfermedades renales	58%	63%	45%	44%	66%	55%	75%	63%	62%	45%	48%	64%	43%	69%	55%	38%	61%	67%	80%	52%	75%	61%	55%	59%	69%	65%	62%	60%	51%	51%	59%	47%	55%
Lesiones de transporte como accidentes de tráfico	45%	41%	39%	45%	37%	44%	48%	43%	55%	31%	21%	40%	21%	59%	47%	28%	51%	69%	48%	25%	48%	51%	38%	46%	60%	41%	70%	51%	42%	40%	61%	31%	41%
Enfermedades respiratorias crónicas como el asma como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	40%	47%	38%	35%	43%	42%	54%	34%	48%	32%	38%	40%	28%	42%	34%	21%	36%	44%	45%	47%	54%	36%	28%	35%	38%	42%	49%	24%	38%	40%	59%	40%	39%
Trastornos por consumo de sustancias, como adicción a las drogas o al alcohol	35%	38%	42%	42%	52%	52%	42%	22%	51%	33%	28%	29%	17%	43%	24%	12%	43%	35%	46%	21%	38%	43%	30%	42%	0%	26%	65%	16%	35%	39%	30%	29%	55%
Infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía, como neumonía o tuberculosis	34%	40%	27%	29%	40%	32%	40%	39%	42%	18%	17%	50%	27%	40%	29%	18%	43%	27%	32%	39%	55%	43%	31%	39%	31%	39%	44%	25%	30%	38%	38%	29%	29%
Trastornos neurológicos como la demencia o la enfermedad de Parkinson	33%	34%	42%	38%	30%	46%	39%	25%	26%	27%	34%	29%	24%	36%	39%	31%	33%	20%	19%	43%	22%	33%	28%	19%	22%	34%	31%	37%	42%	45%	25%	46%	39%
Enfermedades del sistema digestivo como cirrosis o enfermedad hepática	28%	29%	20%	25%	33%	25%	31%	41%	27%	20%	16%	26%	26%	45%	29%	20%	28%	29%	33%	20%	37%	28%	46%	37%	38%	32%	28%	29%	24%	14%	30%	18%	20%
Suicidio	25%	22%	36%	37%	28%	40%	33%	18%	22%	28%	19%	22%	17%	40%	19%	20%	20%	13%	19%	24%	21%	20%	19%	23%	12%	31%	45%	22%	19%	28%	23%	28%	32%
'Muertes accidentales como ahogamientos, incendios y caídas'	22%	20%	15%	19%	33%	19%	25%	23%	23%	13%	10%	14%	23%	51%	21%	14%	21%	38%	20%	13%	29%	21%	21%	24%	33%	22%	33%	14%	16%	17%	22%	11%	19%
Violencia interpersonal como homicidio / asesinato	14%	18%	11%	12%	33%	10%	17%	13%	37%	6%	6%	5%	22%	29%	6%	9%	8%	9%	31%	6%	22%	8%	13%	12%	0%	14%	36%	6%	8%	16%	14%	7%	13%
Terrorismo y conflicto	12%	6%	6%	9%	11%	5%	18%	10%	39%	5%	7%	4%	28%	25%	4%	5%	4%	21%	13%	3%	15%	4%	5%	5%	22%	9%	19%	3%	7%	9%	29%	9%	9%
VIH / SIDA o infecciones de transmisión sexual (ITS)	11%	16%	9%	10%	21%	10%	15%	9%	25%	8%	5%	2%	14%	25%	10%	3%	4%	11%	17%	9%	13%	4%	8%	10%	0%	12%	44%	2%	9%	9%	6%	6%	10%

CAUSAS DE MUERTE :

¿A QUÉ LE TEMEN
MÁS LAS
PERSONAS?

Cuando se les pregunta cuál sería la forma más desagradable de morir, las elecciones son cáncer, seguido de un accidente, terrorismo o lesiones en el transporte

% menciones de las 3 principales maneras más desagradables de morir

█ Most mentions
█ 2nd most mentions
█ 3rd most mentions

	TOTAL	AR	AU	BE	BR	CA	CL	CN	CO	FR	DE	HU	HK	IN	IT	JP	MY	MX	NL	PE	PH	PL	RO	RU	SA	SG	ZA	KR	ES	SE	TR	UK	US
Cancer	40%	39%	45%	41%	32%	48%	43%	38%	36%	30%	32%	49%	52%	32%	54%	22%	52%	29%	41%	47%	38%	30%	47%	43%	53%	32%	43%	44%	43%	40%	37%	37%	49%
'Un accidente como ahogamiento, incendio o caída'	27%	30%	21%	19%	27%	28%	32%	21%	39%	13%	21%	26%	30%	26%	28%	33%	31%	27%	32%	25%	36%	35%	26%	27%	24%	27%	31%	32%	22%	23%	20%	34%	26%
Un ataque terrorista	26%	19%	24%	28%	15%	24%	20%	11%	36%	30%	17%	16%	21%	34%	25%	37%	27%	22%	28%	21%	21%	48%	25%	22%	39%	31%	31%	30%	21%	28%	25%	37%	29%
Una lesión en el transporte, como un accidente de tráfico	23%	23%	19%	15%	12%	16%	21%	22%	24%	14%	12%	16%	20%	31%	20%	33%	17%	28%	24%	9%	36%	39%	24%	23%	26%	25%	32%	34%	31%	21%	13%	25%	15%
Violencia interpersonal	21%	27%	19%	19%	20%	16%	17%	12%	21%	16%	15%	20%	31%	16%	20%	34%	20%	16%	24%	14%	26%	27%	21%	12%	25%	0%	20%	31%	26%	26%	29%	21%	17%
VIH / SIDA o una infección de transmisión sexual (ITS)	16%	14%	12%	12%	15%	13%	19%	21%	24%	11%	8%	15%	16%	24%	11%	8%	16%	22%	26%	5%	27%	34%	12%	11%	29%	0%	22%	22%	18%	10%	11%	16%	10%
Un trastorno neurológico como la demencia o la enfermedad de Parkinson	14%	13%	22%	20%	9%	26%	13%	11%	6%	14%	15%	12%	16%	12%	16%	14%	22%	5%	8%	21%	9%	9%	10%	12%	11%	7%	9%	15%	34%	17%	17%	5%	30%
'Una enfermedad cardiovascular como enfermedad cardíaca, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca'	12%	8%	12%	10%	8%	8%	16%	16%	6%	8%	7%	16%	13%	14%	16%	8%	12%	15%	10%	19%	8%	8%	10%	18%	10%	13%	17%	12%	15%	5%	11%	15%	10%
Trastornos por uso de sustancias, como adicción a las drogas o al alcohol	9%	10%	5%	9%	6%	7%	8%	6%	6%	4%	7%	6%	10%	17%	8%	9%	9%	15%	10%	4%	8%	14%	11%	6%	12%	0%	6%	9%	5%	11%	7%	25%	8%
Una enfermedad respiratoria crónica, como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	8%	7%	12%	8%	6%	11%	7%	13%	8%	3%	11%	10%	7%	12%	5%	3%	12%	5%	6%	10%	6%	3%	5%	7%	4%	6%	5%	8%	4%	8%	20%	3%	13%
Diabetes o enfermedad renal	8%	6%	6%	6%	6%	5%	9%	13%	6%	2%	5%	16%	5%	14%	6%	5%	9%	13%	15%	5%	11%	8%	5%	5%	4%	10%	16%	6%	9%	4%	5%	4%	5%
Una enfermedad del sistema digestivo como cirrosis o enfermedad hepática	6%	6%	9%	6%	3%	6%	4%	10%	5%	4%	6%	11%	5%	11%	5%	1%	8%	4%	4%	3%	7%	5%	6%	9%	5%	10%	8%	6%	5%	4%	8%	4%	7%
Una infección de las vías respiratorias inferiores, como neumonía o tuberculosis	5%	3%	7%	5%	5%	5%	3%	9%	4%	4%	6%	8%	2%	10%	5%	2%	7%	4%	4%	4%	4%	6%	5%	7%	5%	8%	4%	4%	4%	5%	6%	2%	7%

Causas de muerte :

¿EN QUE CREEN LAS PERSONAS TENER MENOR CONTROL Y QUÉ PIENSAN QUE LES PUEDE PASAR?


Las personas piensan que tienen menos control sobre ser víctimas de un ataque terrorista, contraer cáncer o sufrir una lesión de transporte

■ Most mentions
■ 2nd most mentions
■ 3rd most mentions

% diciendo una 3 principales cosas que es mas probable les sucedan

	TOTAL	AR	AU	BE	BR	CA	CL	CN	CO	FR	DE	HU	HK	IN	IT	JP	MY	MX	NL	PE	PH	PL	RO	RU	SA	SG	ZA	KR	ES	SE	TR	UK	US
Ser víctima de un ataque terrorista	32%	28%	46%	34%	14%	42%	29%	13%	40%	30%	34%	21%	43%	31%	29%	25%	49%	20%	31%	41%	20%	39%	44%	25%	33%	22%	38%	35%	22%	34%	42%	26%	54%
Contraer cáncer	31%	28%	36%	28%	20%	37%	35%	19%	33%	20%	28%	33%	19%	30%	40%	32%	36%	26%	30%	28%	33%	25%	27%	29%	44%	24%	41%	36%	46%	33%	40%	32%	38%
Sufrir una lesión de transporte, p. de un accidente de carretera	30%	29%	32%	20%	19%	31%	32%	29%	29%	17%	24%	25%	27%	32%	25%	35%	34%	30%	33%	24%	35%	41%	28%	36%	32%	19%	34%	38%	43%	25%	29%	35%	34%
'Estar involucrado en un accidente como ahogamiento, incendios y caídas'	23%	23%	23%	18%	16%	25%	22%	23%	21%	11%	23%	27%	21%	25%	21%	40%	27%	23%	21%	27%	22%	31%	23%	18%	33%	18%	25%	23%	20%	18%	21%	17%	30%
'Ser víctima de violencia interpersonal como el abuso físico, sexual o emocional'	17%	22%	16%	13%	18%	13%	20%	10%	17%	13%	16%	12%	28%	18%	17%	9%	17%	14%	31%	14%	25%	20%	28%	10%	22%	0%	14%	30%	16%	16%	23%	14%	18%
Tener un trastorno neurológico como demencia o enfermedad de Parkinson.	17%	17%	26%	19%	9%	26%	15%	9%	8%	15%	16%	16%	14%	13%	22%	16%	28%	11%	9%	21%	15%	13%	16%	7%	15%	9%	22%	20%	22%	20%	19%	12%	31%
'Tener una enfermedad cardiovascular como enfermedad cardíaca, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca '	13%	14%	8%	12%	14%	9%	15%	20%	10%	8%	9%	15%	9%	19%	15%	19%	8%	15%	11%	9%	14%	16%	9%	18%	12%	15%	15%	11%	17%	12%	16%	18%	9%
Tener diabetes o una enfermedad renal	9%	6%	5%	7%	11%	6%	8%	15%	5%	7%	5%	11%	8%	20%	8%	8%	9%	14%	13%	6%	12%	15%	9%	11%	9%	16%	14%	7%	9%	8%	6%	12%	4%
Contraer el VIH / SIDA o una infección de transmisión sexual (ITS)	8%	7%	5%	8%	7%	3%	10%	6%	13%	10%	4%	11%	18%	15%	6%	2%	4%	12%	12%	6%	13%	15%	9%	6%	17%	0%	7%	13%	8%	7%	5%	6%	3%
Tener un trastorno por uso de sustancias, como adicción a las drogas o al alcohol	8%	5%	5%	11%	9%	4%	5%	9%	8%	9%	5%	9%	16%	14%	4%	3%	6%	12%	8%	7%	8%	11%	12%	6%	11%	0%	7%	7%	8%	6%	2%	12%	4%
Tener una enfermedad respiratoria crónica como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	7%	6%	7%	8%	8%	5%	5%	9%	8%	8%	5%	5%	7%	14%	6%	3%	8%	8%	7%	4%	9%	9%	6%	8%	6%	11%	8%	9%	3%	8%	3%	11%	6%
Contraer una infección de las vías respiratorias inferiores, como neumonía o tuberculosis	6%	4%	7%	7%	3%	6%	3%	6%	5%	6%	4%	6%	6%	9%	6%	3%	7%	6%	5%	4%	4%	7%	5%	9%	9%	11%	8%	7%	5%	6%	6%	7%	5%
Tener una enfermedad del sistema digestivo como cirrosis o enfermedad hepática	6%	4%	3%	8%	5%	3%	3%	9%	3%	6%	3%	10%	3%	12%	4%	4%	5%	6%	4%	5%	9%	6%	4%	9%	5%	9%	8%	5%	6%	6%	10%	8%	3%

En todos los países, en promedio, las personas piensan que tienen más probabilidades de contraer cáncer, una lesión en el transporte o una enfermedad cardiovascular



% diciendo las 3 principales causas de muerte donde tiene menos control


	TOTAL	AR	AU	BE	BR	CA	CL	CN	CO	FR	DE	HU	HK	IN	IT	JP	MY	MX	NL	PE	PH	PL	RO	RU	SA	SG	ZA	KR	ES	SE	TR	UK	US
Contraer cáncer	31%	23%	35%	42%	16%	41%	31%	13%	28%	33%	25%	30%	38%	20%	40%	38%	39%	20%	27%	30%	31%	16%	39%	26%	24%	15%	35%	27%	43%	34%	45%	37%	40%
Conseguir una lesión de transporte	25%	24%	21%	26%	17%	21%	28%	24%	33%	22%	12%	14%	32%	28%	22%	20%	23%	25%	35%	8%	36%	26%	31%	27%	32%	24%	16%	38%	33%	27%	21%	37%	16%
'Contraer una enfermedad cardiovascular como enfermedad cardíaca, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca'	24%	20%	27%	28%	15%	28%	24%	18%	17%	23%	17%	24%	35%	20%	24%	30%	31%	21%	22%	24%	20%	30%	28%	23%	26%	15%	31%	24%	21%	21%	36%	30%	30%
Tener diabetes o una enfermedad renal	16%	14%	14%	9%	14%	15%	28%	11%	16%	7%	9%	17%	18%	24%	10%	17%	19%	20%	29%	10%	23%	28%	16%	10%	9%	21%	24%	16%	23%	10%	12%	21%	13%
'Estar involucrado en un accidente como ahogamiento, incendios y caídas':	14%	15%	8%	12%	13%	11%	13%	17%	13%	10%	10%	13%	15%	17%	17%	16%	14%	20%	16%	9%	21%	15%	18%	13%	17%	16%	11%	17%	11%	14%	12%	13%	8%
Tener un trastorno neurológico como la demencia o la enfermedad de Parkinson:	11%	8%	16%	13%	5%	15%	10%	8%	7%	9%	12%	12%	6%	10%	13%	13%	16%	6%	4%	13%	7%	8%	11%	5%	5%	6%	11%	9%	18%	17%	14%	8%	24%
Tener una enfermedad respiratoria crónica como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	9%	10%	8%	9%	8%	9%	12%	7%	11%	7%	8%	9%	7%	12%	7%	4%	10%	7%	14%	8%	11%	14%	10%	6%	4%	11%	9%	9%	7%	10%	7%	12%	9%
'Ser víctima de violencia interpersonal como el abuso físico, sexual o emocional'	8%	12%	6%	6%	11%	5%	10%	8%	11%	5%	5%	6%	8%	12%	7%	4%	8%	7%	18%	4%	23%	12%	8%	4%	8%	0%	6%	20%	9%	5%	10%	8%	5%
Contraer una infección de las vías respiratorias inferiores, como neumonía o tuberculosis	8%	6%	7%	7%	5%	8%	6%	10%	6%	3%	5%	7%	15%	11%	7%	6%	9%	3%	8%	6%	9%	14%	11%	12%	8%	9%	7%	8%	8%	5%	8%	7%	7%
Tener una enfermedad del sistema digestivo como cirrosis o enfermedad hepática	7%	5%	7%	5%	4%	4%	6%	12%	5%	3%	3%	14%	11%	13%	6%	10%	8%	6%	7%	3%	10%	8%	6%	10%	11%	10%	13%	4%	11%	7%	6%	4%	6%
Ser víctima de un ataque terrorista	7%	6%	4%	7%	3%	3%	7%	6%	21%	6%	5%	7%	4%	13%	5%	3%	5%	10%	10%	3%	6%	9%	4%	8%	9%	12%	7%	12%	3%	6%	6%	19%	3%
Tener un trastorno por uso de sustancias, como adicción a las drogas o al alcohol	4%	3%	5%	6%	4%	6%	3%	7%	3%	3%	3%	3%	2%	12%	2%	2%	5%	3%	5%	2%	5%	5%	4%	3%	5%	0%	3%	5%	2%	5%	3%	7%	4%
Contraer el VIH / SIDA o una infección de transmisión sexual (ITS)	3%	3%	2%	6%	3%	1%	4%	3%	4%	2%	2%	4%	1%	9%	3%	1%	3%	4%	4%	2%	5%	3%	1%	3%	2%	0%	3%	8%	1%	3%	1%	3%	1%

Hay una variedad de factores que podrían influir en nuestras suposiciones, incluida la cobertura de los medios y la experiencia personal. Los datos muestran que a nivel de país, hay factores que podrían estar teniendo un impacto en la percepción conjeturas de las personas...

... pero a nivel individual es más complejo y la imagen es menos clara...

En varios países, aquellos que dicen que con frecuencia ven lesiones de transporte en las noticias piensan que las lesiones de transporte causan más muertes que aquellos que no las ven en las noticias

Este es particularmente el caso en Arabia Saudita, Perú y Rumania.




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

*Those who list transport injuries in the top 3 things they see most frequently in the news

En algunos países, quienes dicen que con frecuencia ven violencia interpersonal en las noticias piensan que causa una mayor proporción de muertes que aquellos que no la ven en las noticias ...

... pero esto no se aplica en todos los países.




Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

*Those who list interpersonal violence in the top 3 things they see most frequently in the news

La imagen se mezcla cuando se observa qué personas han sido afectadas personalmente por.


Al preguntar sobre el suicidio, aquellos que han sido afectados personalmente por él no tienden a hacer conjeturas más altas que aquellos que no han sido afectados



Please see <http://perils.ipsos.com/> for full details of all sources.

La satisfacción con el sistema de salud varió ampliamente entre países, pero no hubo correlación con la precisión de las personas para estimar las causas de muerte en su país.

P. ¿Hasta que punto, si es que lo está, está usted satisfecho con el Sistema de salud [País]?



Please see <http://perils.ipsos.com> for full details of all sources.

Nota técnica

Estos son los resultados de la Encuesta Ipsos MORI Peligros de la percepción 2020. Se realizaron 16,000 entrevistas entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019.

La encuesta se lleva a cabo en 32 países de todo el mundo, a través del sistema Ipsos Online Panel en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China SAR, Colombia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong SAR China, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y EE. UU.

Aproximadamente 1000 personas de entre 16 y 74 años fueron encuestadas en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, México y España. Aproximadamente 1000 individuos de entre 18 y 74 años fueron encuestados en los Estados Unidos y Canadá. Aproximadamente 500 personas de entre

16 y 74 años fueron encuestadas en Argentina, Bélgica, Colombia, la RAE de Hong Kong, China, Hungría, India, Malasia, Países Bajos, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia y Turquía.

18 de los 32 países encuestados en línea generan muestras representativas a nivel nacional en sus países (Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong SAR China, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia y Estados Unidos).

Brasil, Chile, Colombia, China, India, Malasia, México, Perú, Filipinas, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía producen una muestra nacional que es más urbana y educada, y con mayores ingresos que sus conciudadanos. Nos referimos a estos encuestados como "Upper Deck Consumer Citizens" No son representativos a nivel nacional de su país..

Los datos "reales" para cada pregunta se toman del Estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation Global Burden of Disease Study (2017). Se puede encontrar más información en ghdx.healthdata.org/gbd-2017.

La fuente de los datos de China de la RAE de Hong Kong es <https://www.healthyhk.gov.hk/>.

Cuando los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser + -1 más / menos que la real, esto puede deberse a redondeo, respuestas múltiples o la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

Los datos se ponderan para que coincidan con el perfil de la población.

PELIGROS DE LA PERCEPCION 2020

Para más información contactar:

Carolina Suez

Carolina.suez@ipsos.com