

LES SENIORS FACE AU RISQUE D'INFECTION À PNEUMOCOQUE

ENQUÊTE AUPRÈS DES SÉNIORS DE 65 À 85 ANS

MSD

Ipsos bva



CONTEXTE

L'infection à pneumocoque, causée par une bactérie, peut être particulièrement dangereuse. **Avec l'âge, et surtout après 65 ans, le risque d'infection et de complications graves augmente considérablement.** Cette infection peut provoquer des maladies sérieuses comme la pneumonie. De plus, elle peut entraîner des complications directes menant à l'hospitalisation voire au décès.

Initialement, la prévention par la vaccination était recommandée pour les adultes de 18 ans et plus présentant des risques spécifiques, comme des maladies chroniques ou un système immunitaire affaibli. Cependant, face à l'augmentation des cas en France et reconnaissant le risque accru chez les seniors, **la Haute Autorité de santé (HAS) a décidé d'étendre la recommandation vaccinale :**

Depuis janvier 2025, elle inclut **toutes les personnes de 65 ans et plus**, **indépendamment de leurs facteurs de risque individuels**, afin de mieux protéger cette population vulnérable contre les conséquences potentiellement graves des infections à pneumocoque.

DISPOSITIF DE L'ÉTUDE



ECHANTILLON

450 adultes âgés de 65 à 85 ans

- 195 hommes
- 255 femmes

DATES DE TERRAIN

Du 6 août au 18 août 2026

MÉTHODE

Echantillon représentatif sur les critères suivants :

âge, genre

(échantillon non pondéré)


Données collectées par un questionnaire auto-administré en ligne ou assisté par téléphone

MODE DE COLLECTE

Recrutement via le **Knowledge Panel Ipsos***

*Knowledge Panel : Panel d'individus recrutés selon une méthode d'échantillonnage probabiliste par téléphone, permettant d'inclure également les personnes peu à l'aise avec internet et les outils informatiques, ou non équipées

Les infections à pneumocoque sont mal connues : moins d'un senior sur deux se considère bien informé.



Connaissance de la maladie

Dans quelle mesure êtes-vous informé(e) sur les maladies suivantes ? [Réponse unique] Base totale : n=450

41%

des 65 ans et plus se considèrent **bien informés sur les infections à pneumocoque**.

Les seniors, bien que peu informés, sont conscients de la sévérité des infections à pneumocoque.

81%

des 65-85 ans considèrent que **contracter une infection à pneumocoque serait grave.**



Pensez-vous que si vous contractez une infection à pneumocoque, cela puisse être grave ?
[Réponse unique] Base totale : n=450




52%

des 65-85 ans ne savent pas que **le risque d'infections à pneumocoque augmente après 65 ans.**

Quelle affirmation vous correspond le plus ? [Réponse unique] Base totale : n=450

Cette méconnaissance du risque accru lié à l'âge semble contribuer à une perception réduite du risque personnel.



Perception du risque

Pensez-vous être confronté(e) au risque de contracter une infection à pneumocoque ? [Réponse unique] Base totale : n=450

30%

des 65-85 ans **se sentent personnellement à risque** de contracter une infection à pneumocoque.




66%

estiment ne pas être à risque car **ils se sentent en bonne santé** et **mènent une vie saine.**

Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous ne pas être confronté(e) au risque de contracter une infection à pneumocoque ? [Réponse multiple] Base « *Ne pense pas être confronté(e) au risque de contracter une infection à pneumocoque* : n=192

Connaissance de la vaccination en France

La vaccination contre les infections à pneumocoque est actuellement disponible en France. Avant de participer à cette étude, en aviez-vous connaissance ? [Réponse unique] Base totale : n=450



55%

des 65-85 ans **savent qu'un vaccin contre les infections à pneumocoque est disponible** en France.

76%

des seniors ayant choisi la vaccination comme prévention face aux infections à pneumocoque l'ont fait sur **recommandation d'un professionnel de santé.**



Vous avez déclaré avoir été vacciné(e) contre les infections à pneumocoque. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous faire vacciner contre les infections à pneumocoque ? [Réponse multiple] Base : 127



L’absence de recommandation par un professionnel de santé est **la première raison évoquée pour expliquer l’absence de prévention par la vaccination**.

Principales raisons du non-recours à ce moyen de prévention :


1. **L’absence de recommandation par un professionnel de santé**
2. **La méconnaissance de ce moyen de prévention**
3. **La méconnaissance des recommandations de prévention les concernant**

Pour quelles raisons n’êtes-vous pas vacciné(e) contre les infections à pneumocoque ?
[Réponse multiple] Base non-vaccinés : 323

SYNTHÈSE



Les infections à pneumocoque restent un sujet relativement méconnu auprès des 65-85 ans.
6 seniors sur 10 se disent mal informés sur le sujet



Le rôle de l'âge comme facteur de risque reste méconnu :

la moitié des seniors ignore que le risque augmente avec l'âge



Peu de seniors se considèrent personnellement exposés au risque de pneumocoque.

Le fait de se sentir en bonne santé tend à éloigner le sentiment de vulnérabilité